

Familie

Raublattgewächse (Boraginaceae)

Beschreibung

Wohl überwiegend zweijährig, bis 50 cm hoch, meist ohne Ausläufer. Kelch anliegend behaart. Stängelgrund kantig, stark glänzend und im Frühjahr mit abwärts gerichteten Haaren. Blüten himmelblau, Schlundschuppen gelb. Blütendurchmesser weniger als 10 mm. Blütezeit Mai–August.

Status

Einheimisch (indigen).

Ökologie


In Feucht- und Nasswiesen.

Vorkommen in Frankfurt

Sicher sehr stark rückläufig. Es ist unklar, ob die Art heute noch in Frankfurt vorkommt. Im Senckenberg-Herbarium liegt nur ein Beleg aus Frankfurt ohne genaue Ortsangabe aus dem 19. Jh. vor. Aufgrund von taxonomischen Schwierigkeiten, können ältere Angaben aus der Literatur nicht ohne Herbarbelege übernommen werden.

Anmerkung

Das Sumpfvergißmeinnicht wird in drei ähnliche und meist nicht unterschiedene Arten – *Myosotis laxa*, *M. nemorosa* und *M. scorpioides* – unterteilt.



© FR, Gouache von E. Schultz, 19. Jh.

