

Familie

Lippenblütler (Lamiaceae)

Beschreibung

Ausdauernd mit vierkantigem, 10-30 cm hohem, ringsum behaartem Stängel, am Grunde verzweigt; mit oberirdischen Ausläufern und lang gestielten Grundblättern, wie die gegenständigen Stängelblätter verkehrt eiförmig mit kaum gezähntem Blattrand. Blüten ca. 2 cm lang, dunkelblau, mit langer Blütenröhre, reduzierter Oberlippe und ca. 0,5 cm langer Unterlippe. Blüten zu mehreren in Scheinquirlen; Tragblätter ganzrandig. Blütezeit: Mai-August.

Status

Einheimisch (indigen), ungefährdet und weit verbreitet.

Ökologie

Auf nährstoffreichen Standorten in Grünland, Gebüsch, Wäldern und Säumen.

Vorkommen in Frankfurt

Außerhalb der dicht bebauten Bereiche weit verbreitet, im Stadtwald selten. Keine Bestandsveränderung nachweisbar.

Anmerkung

Eine züchterisch hergestellte Sorte „Atropurpurea“ mit glänzenden, dunkelroten Blättern verwildert gelegentlich. Funde im Stadtgebiet könnten sich teilweise auf diese Sorte beziehen.



0 1 2 3 4 5
km

© Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft
Karte © Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main, 2008
Liz.-Nr. 6233-2008-I