

Familie

Korbblütler (Asteraceae)

Beschreibung

Staupe, 30-100 Zentimeter hoch, mit Rhizom. Blätter linear-lanzettlich, gesägt. Blütenstand eine Doldenrispe mit vielen Köpfchen, jeweils mit zahlreichen weißlichen Röhren- und 8-13 weißen Zungenblüten, Zungen 4-6 mm lang. Blütezeit: Juli-September.

Status

Einheimisch (indigen), noch ungefährdet, aber durch den Rückgang von Feuchtwiesen stark rückläufig.

Ökologie

Auf Feucht- und Nasswiesen, an Gräben und an Gewässern.

Vorkommen in Frankfurt

Entsprechend der ehemals großflächig vorhandenen Feuchtwiesen, war auch *Achillea ptarmica* früher weiter verbreitet. So liegen aus dem 19. Jh. praktisch nur allgemeine Angaben zu ihrem Vorkommen vor. Mittlerweile in Frankfurt selten, mit Schwerpunkt in den verbliebenen Feuchtwiesen des Nidda-Tals.

Anmerkung

Die Sumpf-Schafgarbe wird gelegentlich in einer Form mit gefüllten Blüten als Zierpflanze in Gärten verwendet. Bei dieser Zuchtform sind die Röhren- zu Zungenblüten umgewandelt.



© D. Bönsel, 2011.

0 1 2 3 4 5
km

© Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft
Karte © Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main, 2008
Liz.-Nr. 6233-2008-I